

正 本

檔 號：
保存年限：

農業部農糧署 函

地址：54044南投縣南投市光華路
8號

承辦人：朱慧敏

電話：049-2332380分機1027

傳真：049-2341116

電子信箱：chm1212@mail.afa.gov.tw

11070

臺北市信義區基隆路一段101巷19號

受文者：彩虹大地有限公司

發文日期：中華民國113年4月16日

發文字號：農糧企字第1131108655號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：函轉農業部公告修正「畢芬寧、撲滅松、祿芬隆」農藥使用
方法及其範圍案，請查照。

說明：依據農業部113年4月8日農授防字第1131875619號書函（如
附件）辦理。

正本：環球國際驗證股份有限公司、中華驗證有限公司、采園生態驗證有限公司、國立中興大學農產品驗證中心、成大智研國際驗證股份有限公司、國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心、安心國際驗證股份有限公司、雲嘉國際驗證股份有限公司、暉凱國際檢驗科技股份有限公司、財團法人農業科技研究院、環虹銀騰科技股份有限公司、台灣食農安全檢驗股份有限公司、藍鵲驗證服務股份有限公司、朝陽科技大學、彩虹大地有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、全民儲碳股份有限公司、稻香驗證有限公司、奕嘉國際有限公司

副本：財團法人全國認證基金會、農業部、本署企劃組(均含附件)


代理署長 蘇茂祥

本案依照分層負責授權單位主管決行

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月8日
發文字號：農授防字第1131875619A號



主旨：公告修正「畢芬寧」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

說明：新增2.8%(w/w)畢芬寧水基乳劑(EW)之使用範圍(此範圍為業者申請2.8%EC變更為較安全劑型)。

代理部長 陳駱季

「畢芬寧」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 8 日農授防字第 1131875619A 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
2.8% 畢芬寧 EW	大成化學工業股份有限公司	113 年 4 月 8 日	本藥劑係 2.8% 畢芬寧 EC 轉換為更安全劑型

二、「畢芬寧」農藥使用方法與範圍一覽表

2.8(%) (w/w) 畢芬寧 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	鱗翅目害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	禁用於豆苗。	
豆科乾豆類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	禁止使用於豆苗。	
落花生	夜蛾類	1 公升	1,000	生育期間心葉被害時施藥。				14		
胡麻	鱗翅目害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
胡麻	蚜蟲類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		重複範圍，本項刪除。
胡麻	蚜蟲類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		重複範圍，本項刪除。
胡麻	蚜蟲類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
胡麻	薊馬類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
花椰菜	銀葉粉 蝨	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。		2		9		
十字花 科小葉 菜類	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
芥藍	銀葉粉 蝨	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
龍葵	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
龍葵	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
龍葵	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
龍葵	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
蔥	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蔥	夜蛾類	1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蔥	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆科根 菜類	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	禁用於豆 苗。	
豆科根	薊馬類	0.5-0.8	1,000	害蟲發生	7			14	禁止使用於	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菜類		公升		時開始施 藥。					豆苗。	
十字花 科根菜 類	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
番茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
番茄	夜蛾類	0.5-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
番茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
番茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
甜椒	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
辣椒	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
辣椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
茄子	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	二點小 綠葉蟬	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	棉蚜	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
茄子	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枸杞	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
香瓜茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
香瓜茄	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
香瓜茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
香瓜茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
金針	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	適用於金針 花。	本項修 正。
								14	適用於碧玉 筍。	
金針	蚜蟲類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施	7	最多 3 次		6	適用於金針 花。	本項修 正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
金針	蚜蟲類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於碧玉筍。	本項修正。
金針	薊馬類	0.8-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	適用於金針花。	本項修正。
								14	適用於碧玉筍。	
洛神葵	鱗翅目害蟲	0.4-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
洛神葵	蚜蟲類	0.4-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		重複範圍，本項刪除。
洛神葵	蚜蟲類	0.4-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	注意藥液需噴及新梢處。	
秋葵	鱗翅目害蟲	0.4-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
秋葵	蚜蟲類	0.3-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
秋葵	薊馬類	0.4-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
豆菜類	鱗翅目害蟲	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	禁用於豆苗。	
豆菜類	蚜蟲類	0.5-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	1. 禁止使用於豆苗。 2. 豆莢採收前3天停止用藥。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆菜類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	禁止使用於 豆苗。	
瓜果類	鱗翅目 害蟲	0.8-2公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜果類	鱗翅目 害蟲	0.8-2公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	銀葉粉 蝨	1-1.7公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜果類	金花蟲 類	0.8-2公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	金花蟲 類	0.8-2公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜果類	薊馬類	0.8-2公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	薊馬類	0.8-2公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜果類	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7	2		15		
瓜果類	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7	2		6		重複範 圍，本 項刪 除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
香蕉	薊馬類	0.3-0.9公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
番荔枝	小黃薊馬	0.75-1.0公升	1,000	害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥。	7	3-4		6		
葡萄	神澤氏葉蟬		1,000	害蟲發生時開始施藥。	14	2		9		
楊桃	葉蟬類	1.2-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		9		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
番石榴	葉蟬類	0.6-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
檬果	葉蟬類	0.75-0.9公升	2,000	抽穗及開花期受危害時施藥。	10			20	為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。	
檬果	薊馬類	0.9-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			20		
梨	二點葉蟬	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
蘋果	二點葉蟬	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
桃	蚜蟲類	0.7公升	1,400	蚜蟲發生時施藥。				10		
柑桔類	柑桔潛葉蛾	2公升	1,000	新芽萌發時施藥。	7-10	2-3		10		
柑桔類	柑桔葉	2.6公	750	害蟲發生	7	2		10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	蟎	升		時開始施 藥。						
花木	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	夜蛾類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
菊	蚜蟲類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				15		
菊	薊馬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	薊馬類		1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞菊花 使用。	
菊	葉蟎類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	二點葉 蟎	0.5 公 升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7				限觀賞菊花 使用。	
百合	夜蛾類	0.5-1.0 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	二點小 綠葉蟬	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
百合	花薊馬 類	1-2.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	限食用花苞 品種使用。	
百合	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7			6		
玫瑰	葉蟎類	0.5-1.3 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			15		
茶	捲葉蛾 類	3 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。				15		
茶	小綠葉 蟬	0.5 公 升	2,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				15		
茶	葉蟎類	0.5 公 升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。				15		
茶	神澤氏 葉蟎	0.5 公 升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。				15		

2.5(%) (w/w)畢芬寧 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	禁用於豆苗	
豆科乾 豆類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	禁止使用於 豆苗。	
落花生	夜蛾類	1 公升	1,000	生育期間 心葉被害 時施藥。				14		
胡麻	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
胡麻	蚜蟲類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		重複範圍，本 項刪除。
胡麻	蚜蟲類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		重複範圍，本 項刪除。
胡麻	蚜蟲類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
胡麻	薊馬類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
十字花 科包葉 菜類	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
花椰菜	銀葉粉 蝨	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
十字花 科小葉 菜類	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
芥藍	銀葉粉	1-1.5 公	1,000	害蟲發生	7	3		9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	蟲	升		時開始施 藥。						
龍葵	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
龍葵	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
龍葵	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
龍葵	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
蔥	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蔥	夜蛾類	1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蔥	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆科根 菜類	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	禁用於豆 苗。	
豆科根 菜類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	禁止使用於 豆苗。	
十字花 科根菜 類	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
番茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
番茄	夜蛾類	0.5-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施	7			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
番茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
番茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
甜椒	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
辣椒	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
辣椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	二點小 綠葉蟬	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	棉蚜	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
茄子	植食性	0.5-1.5	1,000	害蟲發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	瓢蟲類	公升		時開始施 藥。						
茄子	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枸杞	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	本項修 正。
								9	適用於枸杞 葉。	
香瓜茄	鱗翅目	0.5-1.5	1,000	害蟲發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	害蟲	公升		時開始施 藥。						
香瓜茄	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
香瓜茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
香瓜茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
金針	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	<u>適用於金針 花。</u>	本項修 正。
								14	<u>適用於碧玉 筍。</u>	
金針	蚜蟲類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	<u>適用於金針 花。</u>	本項修 正。
								14	<u>適用於碧玉 筍。</u>	
金針	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	<u>適用於金針 花。</u>	本項修 正。
								14	<u>適用於碧玉 筍。</u>	
洛神葵	鱗翅目 害蟲	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
洛神葵	蚜蟲類	0.6-1.2	1,000	蚜蟲發生				6	注意藥液需	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升		初期全株施藥1次。					噴及新梢處。	
洛神葵	蚜蟲類	0.4-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		重複範圍，本項刪除。
洛神葵	蚜蟲類	0.4-2公升	1,000	蚜蟲發生初期全株施藥1次。				6	注意藥液需噴及新梢處。	重複範圍，本項刪除。
秋葵	鱗翅目害蟲	0.4-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
秋葵	蚜蟲類	0.3-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
秋葵	薊馬類	0.4-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
豆菜類	鱗翅目害蟲	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	禁用於豆苗。	
豆菜類	蚜蟲類	0.5-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	1. 禁止使用於豆苗。 2. 豆莢採收前3天停止用藥。	
豆菜類	薊馬類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	禁止使用於豆苗。	
瓜果類	鱗翅目害蟲	0.8-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	禁止使用於河床地西瓜之害蟲防治。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
瓜果類	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜果類	銀葉粉 蝨	1-1.7 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜果類	金花蟲 類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜果類	金花蟲 類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜果類	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7	2		15		
瓜果類	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7	2		6		重複範 圍，本 項刪 除。
香蕉	薊馬類	0.3-0.9 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
番荔枝	小黃薊 馬	0.75-1.0 公升	1,000	害蟲於幼 嫩心葉發 生時開始 施藥。	7	3-4		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葡萄	神澤氏葉蟬		1,000	害蟬發生時開始施藥。	14	2		9		
楊桃	葉蟬類	1.2-1.5公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7	2		9		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
番石榴	葉蟬類	0.6-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
檬果	葉蟬類	0.75-0.9公升	2,000	抽穗及開花期受危害時施藥。	10			20	為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。	
檬果	薊馬類	0.9-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			20		
梨	二點葉蟬	0.6-0.8公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
蘋果	二點葉蟬	0.6-0.8公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7			10		
桃	蚜蟲類	0.7公升	1,400	蚜蟲發生時施藥。				10		
柑桔類	柑桔潛葉蛾	2公升	1,000	新芽萌發時施藥。	7-10	2-3		10		
柑桔類	柑桔葉蟬	2.6公升	750	害蟬發生時開始施藥。	7	2		10		
花木	粉蝨類	0.6-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菊	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	夜蛾類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	蚜蟲類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				15		
菊	薊馬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	薊馬類		1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞菊花 使用。	
菊	葉蟬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
菊	二點葉 蟬	0.5 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞菊花 使用。	
百合	夜蛾類	0.5-1.0 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	二點小 綠葉蟬	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	花薊馬 類	1-2.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	限食用花苞 品種使用。	
百合	二點葉 蟬	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
玫瑰	葉蟬類	0.5-1.3	2,000	害蟲發生	7			15		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
茶	捲葉蛾 類	3 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。				15		
茶	小綠葉 蟬	0.5 公 升	2,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				15		
茶	葉蟬類	0.5 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。				15		
茶	神澤氏 葉蟬	0.5 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。				15		

2.8(%) (w/w)畢芬寧水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	鱗翅目害蟲	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	禁用於豆苗。	變更安全劑型
豆科乾豆類	薊馬類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	禁止使用於豆苗。	
落花生	夜蛾類	1公升	1,000	生育期間心葉被害時施藥。				14		
胡麻	鱗翅目害蟲	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
胡麻	蚜蟲類	0.6-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
胡麻	薊馬類	0.6-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
十字花科包葉菜類	鱗翅目害蟲	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
花椰菜	銀葉粉蝨	1-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。		2		9		
十字花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
芥藍	銀葉粉蝨	1-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		9		
龍葵	鱗翅目害蟲	0.5-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
龍葵	蚜蟲類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
龍葵	植食性瓢蟲類	0.5-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
龍葵	薊馬類	0.5-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥	鱗翅目害蟲	0.8-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
蔥	夜蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
蔥	薊馬類	0.8-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
豆科根菜類	鱗翅目害蟲	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	禁用於豆苗。	
豆科根菜類	薊馬類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	禁止使用於豆苗。	
十字花科根菜類	鱗翅目害蟲	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
番茄	鱗翅目害蟲	0.5-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
番茄	夜蛾類	0.5-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
番茄	植食性瓢蟲類	0.5-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
番茄	薊馬類	0.5-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
甜椒	鱗翅目	0.5-1.5	1,000	害蟲發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	害蟲	公升		時開始施 藥。						
甜椒	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
甜椒	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
辣椒	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
辣椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	二點小 綠葉蟬	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	棉蚜	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
茄子	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
枸杞	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	
								9	適用於枸杞 葉。	
枸杞	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	果菜類採收 前 6 天(設 施栽培 12 天)停止施 藥。	
								9	適用於枸杞 葉。	
香瓜茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
香瓜茄	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
香瓜茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
香瓜茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	鱗翅目 害蟲	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	植食性 瓢蟲類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
野茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
金針	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	<u>適用於金針 花。</u>	
								14	<u>適用於碧玉 筍。</u>	
金針	蚜蟲類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 3 次		6	<u>適用於金針 花。</u>	
金針	蚜蟲類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	<u>適用於碧玉 筍。</u>	
金針	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	<u>適用於金針 花。</u>	
								14	<u>適用於碧玉 筍。</u>	
洛神葵	鱗翅目 害蟲	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
洛神葵	蚜蟲類	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	注意藥液需 噴及新梢 處。	
秋葵	鱗翅目 害蟲	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
秋葵	蚜蟲類	0.3-1.3	1,500	害蟲發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
秋葵	薊馬類	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	禁用於豆 苗。	
豆菜類	蚜蟲類	0.5-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	3. 禁止使 用於豆 苗。 4. 豆莢採 收前 3 天停止 用藥。	
豆菜類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	禁止使用於 豆苗。	
瓜果類	鱗翅目 害蟲	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	銀葉粉 蟲	1-1.7 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜果類	金花蟲 類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁止使用於 河床地西瓜 之害蟲防 治。	
瓜果類	二點葉 蟎	0.6-0.8 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7	2		15		
香蕉	薊馬類	0.3-0.9	1,000	害蟲發生	7			9		


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
番荔枝	小黃薊 馬	0.75-1.0 公升	1,000	害蟲於幼 嫩心葉發 生時開始 施藥。	7	3-4		6		
葡萄	神澤氏 葉蟬		1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	14	2		9		
楊桃	葉蟬類	1.2-1.5 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7	2		9		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
番石榴	葉蟬類	0.6-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
檬果	葉蟬類	0.75-0.9 公升	2,000	抽穗及開 花期受危 害時施 藥。	10			20	為保護採粉 昆蟲及天 敵,盛花期 避免施藥。	
檬果	薊馬類	0.9-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			20		
梨	二點葉 蟬	0.6-0.8 公升	1,500	害蟬發生 時開始施 藥。	7			12		
蘋果	二點葉 蟬	0.6-0.8 公升	1,500	害蟬發生 時開始施 藥。	7			10		
桃	蚜蟲類	0.7 公 升	1,400	蚜蟲發生 時施藥。				10		
柑桔類	柑桔潛 葉蛾	2 公升	1,000	新芽萌發 時施藥。	7-10	2-3		10		
柑桔類	柑桔葉 蟬	2.6 公 升	750	害蟬發生 時開始施	7	2		10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
花木	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	鱗翅目 害蟲	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	夜蛾類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
菊	蚜蟲類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				15		
菊	薊馬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	薊馬類		1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞菊花 使用。	
菊	葉蟬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			15		
菊	二點葉 蟬	0.5 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7				限觀賞菊花 使用。	
百合	夜蛾類	0.5-1.0 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	二點小 綠葉蟬	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	蚜蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	花薊馬	1-2.5 公	1,000	害蟲發生	7			6	限食用花苞	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	類	升		時開始施藥。					品種使用。	
百合	二點葉蟎	0.6-0.8公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
玫瑰	葉蟎類	0.5-1.3公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			15		
茶	捲葉蛾類	3公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。				15		
茶	小綠葉蟬	0.5公升	2,000	萌芽初期害蟲發生時開始施藥。				15		
茶	葉蟎類	0.5公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。				15		
茶	神澤氏葉蟎	0.5公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。				15		

農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月8日
發文字號：農授防字第1131875619B號



主旨：公告修正「撲滅松」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

說明：新增50%(w/w)撲滅松水基乳劑(EW)之使用範圍(此範圍為業者申請50%EC變更為較安全劑型)。

代理部長 陳駱季

「撲滅松」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 8 日農授防字第 1131875619B 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
50% 撲滅松 EW	大成化學工業股份有限公司	113 年 4 月 8 日	本藥劑係 50%撲滅松 EC 轉換為更安全劑型

二、「撲滅松」農藥使用方法與範圍一覽表

20(%) (w/w)撲滅松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	一點螟蟲	2-3 公升秧田至孕穗	400					14	齊穗期至收穫前用藥量為 3-3.75 公升。	本項修正。
水稻	二化螟蟲	2-3 公升(幼株期)	100				孕穗期用藥 3-3.75 公升用動力微粒噴霧機噴藥；人力噴霧器噴藥時用藥量 2 公升，稀釋 400 倍。	21		本項修正。
水稻	瘤野螟	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	夜蛾類	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	夜蛾類	2-3 公升	400	孕穗期至齊穗期。				21		重複範圍，本

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										項刪除。
水稻	稻螟蛉	2-3 公升	400	孕穗期至齊穗期。				21		
水稻	樹蔭蝶	2-3 公升	400	孕穗期至齊穗期。				21		
水稻	稻苞蟲	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	負泥蟲	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	鐵甲蟲	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	薊馬類	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
玉米	薊馬類	1.3-2.5 公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7		施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。	6	玉米薊馬為玉米褪綠斑駁病毒之媒介昆蟲，應於玉米幼苗期防治，以防止病毒傳播。	
玉米	條背土蝗	2.5 公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
小葉菜類、包菜類、根菜類、乾豆類	青椿象	2.5 公升		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	本項修正。
瓜菜類、豆									十字花科蔬菜避免使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
菜類、 果菜類									用。	
綠豆	夜蛾類	1.3-2 公 升	400	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	1.3-2 公 升	400	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	5 公升	400	害蟲發生 時開始施 藥。					限採收乾大 豆者使用。	
大豆	夜蛾類	5 公升	400	害蟲發生 時開始施 藥。					限採收乾大 豆者使用， 防治夜蛾類 幼蟲。	
大豆	椿象類	5 公升	400	害蟲發生 時開始施 藥。					限採收乾大 豆者使用。	
大豆	南方綠 椿象	5 公升	400	結莢期施 藥。	15			14	限採收乾大 豆者使用。	
茭白筍	二化螟 蟲	2-3.5 公 升	100	生 育 初 期，發現 茭白葉鞘 變黃，或 田間水面 有流葉與 折葉情形 時，施藥 1 次，必 要時於分 蘗後期再 施 藥 1 次。				21		
甘藷	甘藷潛 葉蛾	2.5 公 升	400	害蟲發生 時開始施 藥。						
山藥	黑盲椿	2.5-3.75	400	害蟲發生	7	最多		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	象	公升		時開始施藥。		2 次				
薑	玉米螟	2.5-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
黃金果	粉介殼蟲類	2.25-5 公升	400	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
黃金果	果實蠅類	1 公升	75		7				使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		400	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類		1,000	落花後施藥。						
百香果	粉介殼蟲類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。	
榴槤蜜	粉介殼蟲類	2.5-5 公升	400	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		400	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		400	在冬令世代 (1-2	7	2-3	可加入 95% 礦物		1. 施藥防治之前	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				月)，於 若蟲固定 前施藥。			油 150 倍 混 合 噴 施。		2. 先採折 枯枝及 危害嚴 重枝燒 毀。 儘量使 用動力 噴霧機 以增加 防治效 力。 3. 樹勢衰 弱時切 勿混用 礦物 油。	
荔枝	荔枝細 蛾		400	<u>落花後</u> <u>20 天左</u> <u>右施藥。</u>	<u>10</u>	<u>3-4</u>		<u>10</u>		本項修 正。
荔枝	膠蟲		400	害蟲發生 時開始施 藥。				10		
荔枝	荔枝癭 蚧	2.5-3.75 公升	400	害蟲發生 時開始施 藥。	10			10		
檬果	螟蛾類	2.5-3 公 升	400	害蟲發生 時開始施 藥。						
柑桔類	東方果 實蠅	1000 毫 升	75	成熟前施 藥。	7				1. 本劑使 用時加 蛋白質 水解物 1 公 升。 2. 防治果 實蠅係 作局部	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									噴施於 果園周 圍，不 得直接 噴施於 植株 上，標 示僅加 註果實 蠅即可	
甘蔗	大螟	3 公升	400	害蟲發生 時開始施 藥。						

50(%) (w/w)撲滅松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	一點螟 蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕 穗	1,000	採收前。				21	孕穗至齊穗 期用 1.2 公 升。	
水稻	二化螟 蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕 穗	1,000				人力噴霧器 噴藥，孕穗至 齊穗期用 1.2 公升；動力微 粒噴霧機噴 藥時孕穗至 齊穗期用 1.2 公升稀釋 250 倍。	21		
水稻	瘤野螟	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至 齊穗期。				21		重複範圍，本 項刪除。
水稻	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	稻螟蛉	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	樹蔭蝶	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	稻苞蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	負泥蟲	0.8-1.2 公升	1,000	幼穗形成 前。			1. 水稻分 藥期中， 負泥蟲 幼蟲發 生時噴 藥，若施 藥後田 間密度 尚高，隔 15天再 施藥一 次。 2. 施用粒 劑或粉 劑時稻 田需保 持水位 高度3-5 公分，7- 10天，若 水位降 低時必 須灌溉	21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
							補充。			
水稻	鐵甲蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	薊馬類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
玉米	薊馬類	0.5-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7		施藥時務必 將藥液噴灑 至新葉及葉 鞘部位。	6	玉米薊馬為 玉米褪綠斑 駁病毒之媒 介昆蟲，應 於玉米幼苗 期防治，以 防止病毒傳 播。	
玉米	條背土 蝗	1.0 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		6		
<u>小葉菜</u> <u>類、包</u> <u>葉菜</u> <u>類、根</u> <u>菜類、</u> <u>乾豆類</u>	青椿象	1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				10	十字花科蔬 菜避免使 用。	本項修 正。
<u>瓜菜</u> <u>類、豆</u> <u>菜類、</u> <u>果菜類</u>									十字花科蔬 菜避免使 用。	
綠豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2 公升	1,000	結莢期施 藥。	15			14	限採收乾大 豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2 公升	1,000	結莢期施	15			14	限採收乾大	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。					豆者使用。	
大豆	椿象類	2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。					限採收乾大 豆者使用。	
大豆	南方綠 椿象	2 公升	1,000	結莢期施 藥。	15			14	限採收乾大 豆者使用。	
茭白筍	二化螟 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	生育初 期，發現 茭白葉鞘 變黃，或 田間水面 有流葉與 折葉情形 時，施藥 1 次，必 要時於分 蘗後期再 施藥 1 次。				21		
甘藷	甘藷潛 葉蛾	1 公升	1,000	生長期施 藥。		1-2		60		
山藥	黑盲椿 象	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米螟	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
黃金果	粉介殼 蟲類	0.9-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	-	
黃金果	果實蠅 類	0.4 公 升	200		7				使用時加蛋 白質水解 物，果實套 袋前或果實 蠅密度急遽 增加時，作 局部施佈毒	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									餌，每 7 天 1 次，局部 噴施於果園 周圍，不得 直接噴灑於 植株。	
香蕉	粉介殼 蟲類		1,000	十月時施 藥。					清園後隨即 施藥。	
鳳梨	粉介殼 蟲類	1.2 公 升	2,500	鳳梨花謝 約 1 個半 月左右施 藥 1 次。			以人力噴霧 器徐徐噴佈 於果實及果 柄基部。	9		
百香果	粉介殼 蟲類	0.3-0.6 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免施用於 弱勢植株， 以免發生藥 害。	
榴槤蜜	粉介殼 蟲類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		1,000	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		1,000	在冬令世 代 (1-2 月)，於若 蟲固定前 施藥。	7	2-3	可加入 95% 礦物油 150 倍混合噴 施。		1. 施藥防 治之前 先採折 枯枝及 危害嚴 重枝燒 毀。 2. 儘量使 用動力 噴霧機 以增加 防治效 力。 3. 樹勢衰 弱時切 勿混用	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									礦物 油。	
荔枝	荔枝細 蛾		1,000	落花後 20 天左右施 藥。	10	3-4		10		
荔枝	膠蟲		1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
荔枝	荔枝癭 蚋	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			10		
檬果	螟蛾類	1-1.2 公 升	1,000	花稍抽出 後施藥。					自新梢抽出 後每 10 天 施藥 1 次共 2 次，花梢 抽出後每 10 天施藥 1 次共 4 次。	
柑桔類	東方果 實蠅	400 毫 升	200	成熟前施 藥。	7				1. 本劑使 用時加 蛋白質 水解物 1 公 升。 2. 防治果 實蠅係 作局部 噴施於 果園周 圍，不 得直接 噴施於 植株 上，標 示僅加 註果實 蠅即	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									可。	
甘蔗	大螟	1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。						

95(%) (w/w)撲滅松 超低容量液劑 (UL)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	0.75-1 公升						21	空中施藥；第一次施藥：插秧後約 30 天；第二次施藥：插秧後約 90 天。	
水稻	二化螟蟲	0.5-0.75 公升					超低容量地面撒佈；動力微粒噴霧機前管上加流控制器(孔徑 0.8 毫米)操作者位上風噴射，人行方向與風向垂直速度 40-70 公尺/分鐘。	21		本項修正。

水稻	蝗蟲類	0.5-0.75 公升					空中施藥；動力微粒噴霧機噴嘴前或藥管上加流量控制器(孔徑 0.8 毫米)；操作者位上風順風噴射，人行方向與風向成直角，速度 40-70 公尺/分鐘	21		本項修正。
甘蔗	條背土蝗	1 公升		害蟲發生時開始施藥。						

40(%) (w/w)撲滅松 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	1-1.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	一點螟蟲	1-1.5 公升秧田至孕穗	800					14	齊穗期至收穫前用藥量為 1.5 公升。	
水稻	二化螟蟲	1-1.5 公升(幼株期)	200				孕穗期用藥 1.5 公升用動力微粒噴霧	21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
							機噴藥； 人力噴 霧器噴 藥時用 藥量1公 斤，稀釋 800倍。			
水稻	瘤野螟	1-1.5 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	夜蛾類	1-1.5 公 斤	800	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	稻螟蛉	1-1.5 公 斤	800	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	樹蔭蝶	1-1.5 公 斤	800	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	稻苞蟲	1-1.5 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	負泥蟲	1-1.5 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	鐵甲蟲	1-1.5 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	薊馬類	1-1.5 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
玉米	薊馬類	0.7-1.3 公斤	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7		施藥時 務必將 藥液噴 灑至新 葉及葉 鞘部位。	6	玉米薊馬為 玉米褪綠斑 駁病毒之媒 介昆蟲，應 於玉米幼苗 期防治，以 防止病毒傳 播。	
玉米	條背土	1.25 公	1,200	害蟲發生	7	2		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	蝗	斤		時開始施藥。						
小葉菜類、包葉菜類、根菜類、乾豆類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	本項修正。
瓜菜類、豆菜類、果菜類									十字花科蔬菜避免使用。	
綠豆	夜蛾類	0.65-1 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	0.65-1 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用，防治夜蛾類幼蟲。	
大豆	椿象類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	南方綠椿象	2.5 公斤	800	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
茭白筍	二化螟蟲	1-1.75 公斤	200	生育初期，發現茭白葉鞘變黃，或田間水面有流葉與折葉情形				21	-	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				時，施藥 1 次，必 要時於分 藥後期再 施藥 1 次。						
甘藷	甘藷潛 葉蛾	1.25 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。					適用於甘藷 塊根。	
山藥	黑盲椿 象	1.25-1.9 公斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米螟	1.25-1.5 公斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
黃金果	粉介殼 蟲類	1.13-2.5 公斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
黃金果	果實蠅 類	0.53 公 斤	150		7				使用時加蛋 白質水解 物，果實套 袋前或果實 蠅密度急遽 增加時，作 局部施佈毒 餌，每 7 天 1 次，局部 噴施於果園 周圍，不得 直接噴灑於 植株。	
香蕉	粉介殼 蟲類		800	十月時施 藥。					清園後隨即 施藥。	
鳳梨	粉介殼 蟲類		2,000	落花後施 藥。						
百香果	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施	7			10	避免施用於 弱勢植株，	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。					以免發生藥 害。	
榴槤蜜	粉介殼 蟲類	1.25-2.5 公斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		800	花 落 後 20 天 施 藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		800	在冬令世 代(1-2 月)，於 若蟲固定 前施藥。	7	2-3	可 加 入 95%礦物 油 150 倍 混 合 噴 施。		1. 施藥防 治之前 先採折 枯枝及 危害嚴 重枝燒 毀。 2. 儘量使 用動力 噴霧機 以增加 防治效 力。 3. 樹勢衰 弱時切 勿混用 礦物 油。	
荔枝	荔枝細 蛾		800	<u>落花後</u> <u>20 天左</u> <u>右施藥。</u>	<u>10</u>	<u>3-4</u>		<u>10</u>		本項修 正。
荔枝	膠蟲		800	害蟲發生 時開始施 藥。				10		
荔枝	荔枝癭 蚧	1.25-1.9 公斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。	10			10		
檬果	螟蛾類	1.25-1.5 公斤	800	害蟲發生 時開始施						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
柑桔類	東方果 實蠅	533 公 克	150	成熟前施 藥。	7				1. 本劑使 用時加 蛋白質 水解物 1 公 升。 2. 防治果 實蠅係 作局部 噴施於 果園周 圍，不 得直接 噴施於 植株 上，標 示僅加 註果實 蠅即 可。	本項修 正。
甘蔗	大螟	1.5 公 斤	800	害蟲發生 時開始施 藥。						

50%(w/w)撲滅松 水基乳劑 (EW)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		變更安 全劑型
水稻	一點螟 蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕	1,000	採收前。				21	孕穗至齊穗 期用 1.2 公 升。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		穗								
水稻	二化螟 蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕 穗	1,000				人力噴霧器 噴藥，孕穗至 齊穗期用 1.2 公升；動力微 粒噴霧機噴 藥時孕穗至 齊穗期用 1.2 公升稀釋 250 倍。	21		
水稻	瘤野螟	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	稻螟蛉	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	樹蔭蝶	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至 齊穗期。				21		
水稻	稻苞蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。				21		
水稻	負泥蟲	0.8-1.2 公升	1,000	幼穗形成 前。			3. 水稻分 藥期中， 負泥蟲 幼蟲發 生時噴 藥，若施 藥後田 間密度 尚高，隔 15 天再 施藥一 次。 4. 施用粒 劑或粉	21		

[illegible]

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
綠豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2 公升	1,000	結莢期施 藥。	15			14	限採收乾大 豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2 公升	1,000	結莢期施 藥。	15			14	限採收乾大 豆者使用。	
大豆	椿象類	2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。					限採收乾大 豆者使用。	
大豆	南方綠 椿象	2 公升	1,000	結莢期施 藥。	15			14	限採收乾大 豆者使用。	
茭白筍	二化螟 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	生育初 期，發現 茭白葉鞘 變黃，或 田間水面 有流葉與 折葉情形 時，施藥 1 次，必 要時於分 蘗後期再 施藥 1 次。				21		
甘藷	甘藷潛 葉蛾	1 公升	1,000	生長期施 藥。		1-2		60		
山藥	黑盲椿 象	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米螟	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
黃金果	粉介殼	0.9-2 公 升	1,000	害蟲發生	7			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲類	升		時開始施藥。						
黃金果	果實蠅類	0.4 公升	200		7				使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		1,000	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類	1.2 公升	2,500	鳳梨花謝約 1 個半月左右施藥 1 次。			以人力噴霧器徐徐噴佈於果實及果柄基部。	9		
百香果	粉介殼蟲類	0.3-0.6 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。	
榴槤蜜	粉介殼蟲類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		1,000	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		1,000	在冬令世代（1-2 月），於若蟲固定前施藥。	7	2-3	可加入 95% 礦物油 150 倍混合噴施。		1. 施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒毀。	


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									2. 儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。 3. 樹勢衰弱時切勿混用礦物油。	
荔枝	荔枝細蛾		1,000	落花後 20 天左右施藥。	10	3-4		10		
荔枝	膠蟲		1,000	害蟲發生時開始施藥。						
荔枝	荔枝癭蚧	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	10			10		
檬果	螟蛾類	1-1.2 公升	1,000	花稍抽出後施藥。					自新梢抽出後每 10 天施藥 1 次共 2 次，花梢抽出後每 10 天施藥 1 次共 4 次。	
柑桔類	東方果實蠅	400 毫升	200	成熟前施藥。	7				1. 本劑使用時加蛋白質水解物 1 公升。 2. 防治果實蠅係作局部噴施於	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									果園周 圍，不 得直接 噴施於 植株 上，標 示僅加 註果實 蠅即 可。	
甘蔗	大螟	1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月8日
發文字號：農授防字第1131875619C號



主旨：公告修正「祿芬隆」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

說明：新增4.4%(w/w)祿芬隆水懸劑(SC)之使用範圍(此範圍為業者申請4.4%EC變更為較安全劑型)。

代理部長 陳駱季

「祿芬隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 8 日農授防字第 1131875619C 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
4.4%祿芬隆 SC	大成化學工業股份有限公司	113 年 4 月 8 日	本藥劑係 4.4%祿芬隆 EC 轉換為更安全劑型

二、「祿芬隆」農藥使用方法與範圍一覽表

4.4(%) (w/w) 祿芬隆 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		
旋花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
旋花科小葉菜類	金花蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
豌豆	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7	適用於葉用豌豆。	
十字花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
十字花科小葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
十字花科小葉菜類	金花蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
菊科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
茄科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
茄科小 葉菜類	植食性 瓢蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
蔥科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		10		
蔥	夜蛾類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
龍鬚菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
龍鬚菜	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
芹菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
山芹菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
羅勒	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
羅勒	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
紫蘇	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
紫蘇	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
藜科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
莧菜	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
落葵	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
蒜	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10	適用於蒜頭。	
洋蔥	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
落蕎	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10	適用於落蕎頭。	
珠蔥	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10	適用於紅蔥頭。	
番茄	夜蛾類	0.6公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
大豆	夜蛾類	0.4-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		7	適用於毛豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		升		時開始施藥。					豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
草莓	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.4-1.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	

50 g/L (5% w/v) 祿芬隆 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		
旋花科 小葉菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施	7	共 2-3 次		7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
類				藥。						
旋花科小葉菜類	金花蟲類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
豌豆	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7	適用於葉用豌豆。	
十字花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
十字花科小葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
十字花科小葉菜類	金花蟲類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
菊科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
茄科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
茄科小葉菜類	植食性瓢蟲類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
蔥科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		10		
蔥	夜蛾類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍鬚菜	鱗翅目害蟲	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
龍鬚菜	金花蟲類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
芹菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
山芹菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
羅勒	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
羅勒	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
紫蘇	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
紫蘇	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
藜科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
莧菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
落葵	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
蒜	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於蒜 頭。	
洋蔥	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
落蕎	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於落蕎 頭。	
珠蔥	夜蛾類	0.5-1.3	1,500	害蟲發生	7			10	適用於紅蔥	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。					頭。	
果菜類	夜蛾類	0.6 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		6		
番茄	夜蛾類	0.6 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		6		
大豆	夜蛾類	0.4-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		7	適用於毛豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施	7			14	適用於鮮 豆。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
豇豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
草莓	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.4-1.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	

4.4(%) (w/w) 祿芬隆 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		變更安全劑型
旋花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
旋花科小葉菜類	金花蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7		
豌豆	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		7	適用於葉用豌豆。	
十字花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
十字花科小葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
十字花	金花蟲	0.6-0.8	1,500	害蟲發生	7	共 2 次		7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
科小葉 菜類	類	公升		時開始施 藥。						
菊科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
茄科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
茄科小 葉菜類	植食性 瓢蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
蔥科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		10		
蔥	夜蛾類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
龍鬚菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
龍鬚菜	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
芹菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
山芹菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
羅勒	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
羅勒	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
紫蘇	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施	7	共 2-3 次		7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
紫蘇	金花蟲 類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
藜科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
莧菜	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
落葵	鱗翅目 害蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2-3 次		7		
蒜	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於蒜 頭。	
洋蔥	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
落蕎	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於落蕎 頭。	
珠蔥	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於紅蔥 頭。	
番茄	夜蛾類	0.6 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		6		
大豆	夜蛾類	0.4-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		7	適用於毛 豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豌豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	
草莓	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.4-1.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	