

正 本

檔 號：
保存年限：

農業部農糧署 函

地址：54044南投縣南投市光華路
8號

承辦人：朱慧敏

電話：049-2332380分機1027

傳真：049-2341116

電子信箱：chm1212@mail.afa.gov.tw

11070

臺北市信義區基隆路一段101巷19號

受文者：彩虹大地有限公司

發文日期：中華民國113年6月6日

發文字號：農糧企字第1131109040號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉農業部公告修正「三氟派瑞、氟派瑞、賽安勃、滅芬座」農藥使用方法及其範圍案，請查照。

說明：依據農業部113年5月27日農授防字第1131876004號書函（如附件）辦理。

正本：環球國際驗證股份有限公司、中華驗證有限公司、采園生態驗證有限公司、國立中興大學農產品驗證中心、成大智研國際驗證股份有限公司、國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心、安心國際驗證股份有限公司、雲嘉國際驗證股份有限公司、暉凱國際檢驗科技股份有限公司、財團法人農業科技研究院、環虹鋁騰科技股份有限公司、台灣食農安全檢驗股份有限公司、藍鵲驗證服務股份有限公司、朝陽科技大學、彩虹大地有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、全民儲碳股份有限公司、稻香驗證有限公司、奕嘉國際有限公司

副本：財團法人全國認證基金會、本署企劃組(均含附件)

代理署長蘇茂祥

本案依照分層負責授權單位主管決行

檔 號：
保存年限：

農業部 書函

地址：100212臺北市南海路37號

承辦人：王筱婷

電話：(02)3343-6430

傳真：(02)2304-7355

電子信箱：htwang@aphia.gov.tw

受文者：本部農糧署

發文日期：中華民國113年5月27日

發文字號：農授防字第1131876004號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：公告pdf檔、公告(稿)odf檔、附件pdf檔(副本受文者請至本部動植物防疫檢疫署網站下載<https://www.aphia.gov.tw/>，驗證序號：1131876004)

主旨：檢送本部公告修正「三氟派瑞、氟派瑞、賽安勃、滅芬座」農藥使用方法及其範圍(含附件)各1份，請刊登行政院公報。

正本：行政院公報編印中心(請刊登公報)

副本：衛生福利部食品藥物管理署、環境部、經濟部標準檢驗局、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣動植物防疫所、嘉義市政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、花蓮縣動植物防疫所、臺東縣政府、金門縣政府、連江縣政府、澎湖縣政府、臺灣植物保護工業同業公會、中華民國植物保護商業同業公會全國聯合會、臺北市植物保護商業同業公會、作物永續發展協會臺灣分會、本部農糧署、本部農業試驗所、本部農業藥物試驗所、本部桃園區農業改良場、本部臺中區農業改良場、本部苗栗區農業改良場、本部臺南區農業改良場、本部高雄區農業改良場、本部花蓮區農業改良場、本部臺東區農業改良場、本部茶及飲料作物改良場、本部種苗改良繁殖場



農業部農糧署總收文




1131012252 113/05/27

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年5月27日
發文字號：農授防字第1131876004A號



主旨：公告修正「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件，並自
即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876004A 號公告修正

三氟派瑞 水懸劑 (SC) 500 g/L (50% w/v)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		14		
結球萵 苣	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		14		
番茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
甜椒	炭疽病	0.4 公 升	2,500	病害發生初 期開始施藥， 全株均勻噴 施。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
辣椒	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
茄子	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
枸杞	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
香瓜茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
樹番茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
瓜菜類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生初 期開始施藥。	7	連續 2 次		7	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。
胡瓜	白粉病	0.1 公 升	9,000	病害發生初 期開始施藥。	7	共 2 次		3	<u>避免重複使 用氟派瑞單 劑。</u>	本項修 正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜果類	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續2次		7	<u>避免重複使用氟派瑞單劑。</u>	本項修正。
香蕉	炭疽病	0.09-0.3公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18	<u>避免重複使用氟派瑞單劑。</u>	本項修正。
木瓜	炭疽病	0.2-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
番荔枝	炭疽病	0.2-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
酪梨	炭疽病	0.3-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
紅龍果	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
百香果	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.4公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
草莓	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	2		7	<u>避免重複使用氟派瑞單劑。</u>	本項修正。
葡萄	晚腐病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
楊桃	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
蓮霧	炭疽病	0.3-1公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
番石榴	炭疽病	0.4-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
無花果	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
龍眼	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
荔枝	炭疽病	0.2-0.4公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
檬果	炭疽病	0.3公	4,000	結果後施藥。	14			18	結果後每隔	


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升							14 天施藥 1 次至套袋前 為止。	
蘋果	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	病害發生初 期開始施藥。	14	最多 4 次		14		
桃	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	病害發生初 期開始施藥。	14	最多 4 次		14		
梅	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	病害發生初 期開始施藥。	14	最多 4 次		14		
印度棗	炭疽病	0.3-0.4 公升	4,000	病害發生初 期開始施藥。	14	最多 4 次		14		
柿	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果期 施藥。	14			18		
椰子	炭疽病	0.2-0.7 公升	4,000	謝花幼果期 施藥。	14			18		
山茶科 茶類	赤葉枯 病	0.3-1 公 升	4,000	病害發生初 期開始施藥。	14			14		
十字花 科小葉 菜類	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
不結球 萵苣與 半結球 萵苣	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
茼蒿	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
山茼蒿	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
紅鳳菜	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
白鳳菜	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
蔥	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	定植後開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
韭	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	定植後開始 施藥。	7	共 2 次		10	採收韭菜花 者不得使	本項新 增。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									用。	
菠菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新 增。
柑桔類	炭疽病	0.5 公 升	4,000	幼果期開始 施藥。	14	共 3 次		14		本項新 增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年5月27日
發文字號：農授防字第1131876004B號



主旨：公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駁季

「氣派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876004B 號公告修正
500 g/L (50% w/v) 氣派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
馬鈴薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
洋蔥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
胡蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆					施用前請保	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 250-1,000 公升藥液。					持土壤濕 潤。	
枸杞	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
香瓜茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
瓜菜類	根瘤線 蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前 請保持 土壤濕 潤。 2. 胡瓜、 美濃瓜 嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公 升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線蟲	0.46- 0.72 公 升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用前保持土壤濕潤。						
落花生	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						本項新增。
紅豆	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開						本項新

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲			時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						增。
蒜	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	本項新增。
山藥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						本項新增。
牛蒡	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						本項新增。
甘藷	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						本項新增。
蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						本項新增。
燕薺	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						本項新增。
豆薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						本項新增。
薑	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						本項新增。
芋	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，						本項新增。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				施用前請保持土 壤濕潤。						

氟派瑞 水懸劑 (SC) 400 g/L (40% w/v)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
馬鈴薯	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天， 澆灌藥液 1 次， 施用前請保持土 壤濕潤。						
洋蔥	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天， 澆灌藥液 1 次， 施用前請保持土 壤濕潤。						
胡蘿蔔	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						
番茄	根瘤線 蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第 3 天澆灌稀釋藥 液 1 次，每株澆 灌 40 毫升，或 每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前保持 土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
辣椒	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫					施用前請保 持土壤濕 潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。						
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				澆灌 50-1,000 公升藥液。					美濃瓜 嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞 時，會 引起葉 緣發生 黃白化 藥斑之 現象。	
瓜果類	根瘤線 蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，或依植株栽 培密度，每公頃 澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前 請保持 土壤濕 潤。 2. 胡瓜、 美濃瓜 嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞 時，會 引起葉 緣發生 黃白化 藥斑之 現象。	
香蕉	根瘤線 蟲	0.6 公 升	7,500	限苗期使用，使 用前須維持根圈 土壤濕潤，每株 澆灌 2-3 公升藥 液。						
草莓	根瘤線 蟲	0.62- 0.96 公 升	3,000	於植株定植後澆 灌藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫 升，施用前保持 土壤濕潤。						


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						本項新 增。
紅豆	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						本項新 增。
蒜	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天， 澆灌藥液 1 次， 施用前請保持土 壤濕潤。					適用於蒜 頭。	本項新 增。
山藥	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天， 澆灌藥液 1 次， 施用前請保持土 壤濕潤。						本項新 增。
牛蒡	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						本項新 增。
甘藷	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天， 澆灌藥液 1 次， 施用前請保持土 壤濕潤。						本項新 增。
蘿蔔	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						本項新 增。
燕菁	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						本項新 增。
豆薯	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開 時，於土壤濕潤 情形下，將稀釋 液噴佈於土表。						本項新 增。
薑	根瘤線	0.5 公	3,000	定植後第 3 天，						本項新

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	<u>蟲</u>	<u>升</u>		<u>澆灌藥液 1 次，</u> <u>施用前請保持土</u> <u>壤濕潤。</u>						增。
<u>芋</u>	<u>根瘤線</u> <u>蟲</u>	<u>0.5 公</u> <u>升</u>	<u>3,000</u>	<u>定植後第 3 天，</u> <u>澆灌藥液 1 次，</u> <u>施用前請保持土</u> <u>壤濕潤。</u>						本項新 增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年5月27日
發文字號：農授防字第1131876004C號



主旨：公告修正「賽安勃」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駁季

「賽安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876004C 號公告修正

10.26(%) (w/w) 賽安勃 水分散性油懸劑 (OD)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
十字花 科包葉 菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		7		
番茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
甜椒	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
辣椒	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
茄子	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
枸杞	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
香瓜茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
樹番茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
瓜菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1 週後開始 施藥。	7	連續 2 次	藥液量 500 公升/ 公頃，藥 劑量 0.625 公 升/公頃。	4	避免於 開花期 使用。	
瓜果類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1	7	連續 2 次	藥液量 500 公升/ 公頃，藥	4	避免於 開花期 使用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				週後開始 施藥。			劑量 0.625 公 升/公頃。			
大豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於 毛豆。	本項新 增。
刀豆、 花豆、 扁豆、 豇豆、 菜豆、 菜豆、 豌豆、 樹豆、 翼豆、 蠶豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於 鮮豆。	本項新 增。
大豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於 毛豆。	本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣富美 實有限 公司。
刀豆、 花豆、 扁豆、 豇豆、 菜豆、 菜豆、 豌豆、 樹豆、 翼豆、 蠶豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於 鮮豆。	本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣富美 實有限 公司。


10.2(%) (w/w) 賽安勃 濃懸乳劑 (SE)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
荔枝	荔枝細 蛾	0.5 公 升	3,000	花落後 10-20 天 開始施藥。	15	共 2 次		14		
檬果	螟蛾類	0.5 公 升	3,000	新梢抽出後開始 施藥。	15	連續 2 次		21	避免於開花 期使用影響 授粉昆蟲。	
山茶	毒蛾類	0.5 公 升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
山茶	避債蛾 類	0.5 公 升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
茶	毒蛾類	0.5 公 升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶 葉。	
茶	捲葉蛾 類	0.5 公 升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶 葉。	
茶	避債蛾 類	0.5 公 升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶 葉。	

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年5月27日
發文字號：農授防字第1131876004D號



主旨：公告修正「滅芬座」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「滅芬座」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876004D 號公告修正
400 g/L (40% w/v) 滅芬座 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
水稻	紋枯病	0.25 公 升	3,200	病害發生初 期開始施 藥。	14	共 2 次		14		
胡瓜	白粉病	0.32 公 升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次		4		
苦瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
絲瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
冬瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
南瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
扁蒲	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
隼人瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
越瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
夏南瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		
木鱉果	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
西瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		本項新 增。
香瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		本項新 增。
洋香瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 3 次		4		本項新 增。